

LABORATOIRE PRÉLEVEUR	PRÉLÈVEMENT
N° Client: C /	Date de prélèvement
Cachet obligatoire	

PATIENT(E)	PRESCRIPTEUR
NOM	NOM
PRÉNOM	PRÉNOM
Nom de naissance.....	Adresse
Adresse	CP Ville
CP Ville	Tél.
Date de naissance	Fax
Sexe : ☐ F ☐ M	Adresse e-mail :

CHOC ANAPHYLACTIQUE	
Date du choc :	Délai d'apparition :
Grade du choc (de 1 à 4) : ☐ 1. signes cutanés isolées ☐ 2. réaction systémique modérée	
☐ 3. réaction mettant la vie en danger ☐ 4. arrêt cardiaque ou respiratoire	
CIRCONSTANCES D'APPARITION DU CHOC :	
- Exploration fonctionnelle (à préciser) :	
- Anesthésie (indiquer le protocole) :	
- Traitement (préciser la voie) :	
RÉACTIONS CLINIQUES OBSERVÉES :	

ALLERGÈNES SUSPECTÉS À TESTER	ANTÉCÉDENTS D'ALLERGIE

PROTOCOLE DE PRÉLÈVEMENT		
Ce protocole est issu des recommandations de la SFAR 2025		
Histamine	Entre 15 et 30 minutes	1 tube EDTA Centrifugation douce (900 à 1000 g) pendant 10-15 minutes T° réfrigérée, puis congélation du plasma surnageant.
Tryptase (pic)	Entre 30 minutes et 2 heures	1 tube EDTA ou Sérum
Tryptase (base)	>24 heures après la fin des symptômes	1 tube EDTA ou Sérum
IgE spécifiques : ammonium quaternaire (curares), latex, chlorhexidine	1 tube Sérum	